

# Merthiolate®

digliconato de clorexidina

## APRESENTAÇÕES

Solução 10mg/mL: Embalagem com 1 frasco contendo 30mL.

Solução spray 10mg/mL: Embalagem com 1 frasco spray contendo 45mL.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO: USO DERMATOLÓGICO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução contém:

digliconato de clorexidina ..... 10mg

veículo q.s.p. .... 1mL

(hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água).

Cada mL da solução spray contém:

digliconato de clorexidina ..... 10mg

veículo q.s.p. .... 1mL

(hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água).

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

MERTHIOLATE® é indicado na antisepsia (desinfecção e limpeza) da pele e de pequenos ferimentos.

##### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento tem ação específica sobre as bactérias, dificultando a sua proliferação. Possui a propriedade de matar bactérias (bactericida).

##### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

MERTHIOLATE® é contraindicado para pacientes que apresentem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. MERTHIOLATE® apresenta baixo potencial de toxicidade sendo pouco absorvido pela pele íntegra, portanto, o seu uso é considerado seguro na concentração de 10mg/mL. Está contraindicado para antisepsia ocular.

##### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

MERTHIOLATE® é usado para a limpeza local de uma ferida. Deve-se tomar o cuidado ao utilizar o medicamento, evitando o contato com os olhos e ouvidos. Caso ocorra o contato com os olhos, lave-os abundantemente.

**Interação medicamentosa:** não são conhecidas interações medicamentosas com o digliconato de clorexidina.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião dentista.**

**Evite contato com tecido, pois poderá manchá-lo.**

##### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

**Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

MERTHIOLATE® apresenta-se como uma solução límpida, incolor e inodora.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

##### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

###### USO DERMATOLÓGICO

###### Frasco de 30 mL

Espalhar quantidade suficiente do produto na área afetada, quando necessário. Aplicar o produto de 3 a 4 vezes ao dia. Se necessário, pode-se cobrir a área afetada com gaze ou outros curativos.

###### Spray de 45 mL

Posicione a válvula em direção a área afetada, mantendo uma distância de 5 a 10 cm do local ferido.

Pressione 2 a 3 vezes, ou conforme a extensão do ferimento. Aplicar o produto de 3 a 4 vezes ao dia. Se necessário, pode-se cobrir a área afetada com gaze ou outros curativos.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-**

dentista.

MERTHIOLATE® deve ser utilizado para assepsia do ferimento até a cicatrização das feridas.



**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não há problemas significativos no caso de esquecimentos. Necessitando utilizar novamente o medicamento, reaplique-o sobre a ferida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ao aplicar o produto sobre a pele e ocorrer alguma hipersensibilidade, deve-se suspender o seu uso e procurar orientação médica.

**Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):** Nova erupção (ferida) ou agravamento da pele, vermelhidão, ardor, coceira ou inchaço no local da aplicação.

**Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizaram este medicamento):** Reação alérgica: coceira, urticária, inchaço no rosto ou nas mãos, inchaço ou formigamento na boca ou garganta, aperto no peito, dificuldade para respirar.

Fonte: <http://health.kernan.org/drug/notes/Chlorhexidine-On-the-skin.htm>

Realizado por University of Maryland Rehabilitation & Orthopedic Institute, 2200, Kerman Drive, Baltimore, MD 21207. 1-888-453-7626.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Caso ocorra contato com os olhos, lavá-los abundantemente em água corrente. Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

Registro M.S. nº 1.7817.0086  
Farm. Resp. Fernando Costa Oliveira  
CRF-GO nº 5.220

**Nº do Lote, Data de Fabricação  
e Prazo de Validade: VIDE CARTUCHO**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo  
os sintomas procure orientação médica.**



**Registrado por:  
Cosmed Indústria de Cosméticos e  
Medicamentos S.A.**

Avenida Ceci, nº 282, Módulo I - Tamboré  
Barueri - SP - CEP 06460-120  
C.N.P.J.: 61.082.426/0002-07  
Indústria Brasileira

**Fabricado por:  
Brainfarma Indústria Química  
e Farmacêutica S.A.**

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA  
Anápolis - GO - CEP 75132-020



**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 20/03/2015**

816 - F04  
443408 - 04/2015

